

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਲੋਦਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ

1 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਕੀ ਹੈ?

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ, ਜਿਗਰ ਦੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਵਾਇਰਸ (HAV) ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। HAV, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਟੱਟੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ, HAV ਦੀ ਲਾਗ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਫੈਲਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਨਾਲ:

- “ਜੁਕਾਮ ਵਰਗੀ” ਹਲਕੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ
- ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣਾ)
- ਢਿੱਡ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੱਟੀਆਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।



ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲੱਗਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਲੋਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਤੋਂ ਬਚਾਉ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

- ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ: ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਅਮੈਰੇਕਨ ਇੰਡੀਅਨ, ਅਲਾਸਕਾ ਨੇਟਿਵ, ਅਤੇ ਪੇਸੇਫਿਕ ਆਈਲੈਂਡਰ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ।
- ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ, ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਟਰੀਟ ਡਰੱਗਜ਼ (ਨਸ਼ੇ) ਵਰਤਦੇ ਹਨ।
- ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਗਰ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ।
- ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਲੋਨਿੰਗ ਲਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਚਿਰਾਂ ਤੱਕ ਬਚਾਉ ਕਰਨ ਲਈ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦੋ ਲੋਦੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਲੋਦਾ, ਦੂਜੇ ਲੋਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।



3 ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਲੋਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਦੂਜਾ ਲੋਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਲੋਦੇ ਤੋਂ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਲੋਦਾ ਲਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੀਮਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਲੋਦਾ ਲਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੇ ਲੋਦੇ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਜਾਂ ਗਰਭ ਵਿਚਲੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ।

2 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਲੋਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਦਾ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਰੇਬੀਅਨ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਏਸ਼ੀਆ (ਜਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ), ਅਫਰੀਕਾ, ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ। ਇਹ ਲੋਦੇ ਸਫਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
- ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਊਨਟੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫੈਲੀ ਰਹੀ ਸੀ।

4 ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੇ ਲੋਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਖਤਰੇ ਹਨ?

ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਲੋਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਾਂਗ, ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ। ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੇ ਲੋਦੇ ਨਾਲ, ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ, ਜਾਂ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।

ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਲੋਦਾ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਹਲਕੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

- ਲੋਦਾ ਲੱਗਾ ਥਾਂ ਦੁਖਣਾ (2 ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦੇ, ਅਤੇ 5 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਬੱਚੇ ਦੇ)
- ਸਿਰਦਰਦ (6 ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਦੇ ਅਤੇ 20 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਦੇ)
- ਭੁੱਖ ਨਾ ਲੱਗਣਾ (ਤਕਰੀਬਨ 12 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਨੂੰ)
- ਖਕੇਵਾਂ (ਤਕਰੀਬਨ 14 ਬਾਲਗਾਂ ਵਿਚੋਂ 1 ਨੂੰ)

ਜੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਦੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 3-5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ

- ਲੋਦਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿਚ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ (ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ)।

5 ਜੇ ਦਰਮਿਆਨਾ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ?

ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਧਾਰਣ ਹਾਲਤ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਵਤੀਰੇ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ। ਅਲਰਜੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੀਐਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿਚ, ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿਚ ਔਖਿਆਈ, ਘੱਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੂਕਣਾ, ਛਪਾਕੀ, ਪਿਲੱਤਣ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਦਿਲ ਤੇਜ਼ ਧੜਕਣਾ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

- ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੋ।
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੋਦਾ ਕਦੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ, ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਈਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ (ਵੀ ਏ ਈ ਆਰ ਐੱਸ) ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਵੀ ਏ ਈ ਆਰ ਐੱਸ ਨੂੰ ਆਪ 1-800-822-7967 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ।

DCH-0452PU

6 ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ?

- ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹ Vaccine Adverse Event Report (VAERS) (ਵੈਕਸੀਨ ਐਡਵਰਸ ਇਵੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਫਾਰਮ) ਭਰਨ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ VAERS ਨੂੰ 1-800-822-7967 ਤੇ ਮੁਫਤ ਫੋਨ ਕਰੋ।
- ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੋ।
1-888-767-4687
- The Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ:
- 1-800-232-2522 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ (ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ)
- <http://www.cdc.gov/nip> ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮਿਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ।
ਜਾਂ <http://www.cdc.gov/ncidod/diseases/hepatitis/hepatitis.htm> ਤੇ CDC ਦਾ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੇਖੋ

ਇਮਿਊਨ ਗਲੋਬੁਲਿਨ (IG)

ਇਮਿਊਨ ਗਲੋਬੁਲਿਨ ਨਾਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

IG ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

- ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ HAV ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵਿਚ IG ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
- ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਏ ਦਾ ਲੋਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ।

IG ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇਹ HAV ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ

ਫਾਇਦੇ

IG, HAV (ਐੱਚ ਏ ਵੀ) ਤੋਂ 3-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਖਤਰੇ

ਬਹੁਤ ਘੱਟ: ਸੋਜ, ਛਪਾਕੀ ਜਾਂ ਅਲਰਜੀ ਦਾ ਰੀਐਕਸ਼ਨ।



U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES
Centers for Disease Control and Prevention
National Immunization Program

Vaccine Information Statement
Hepatitis A IMM 502 ML Punjabi (8/25/98)
Translated by Transcend Translations, Davis, CA
<http://www.transcend.net>

AUTH: P.H.S., Act 42, Sect. 2126.

ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗੇ ਲੋਦਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕੇ, ਲੋਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਲੋਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕੇ, ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ Michigan Care Improvement Registry (ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਕੇਅਰ ਇਮਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਰਜਿਸਟਰੀ) ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਲੋਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਭੇਜੇ।